



Високоєфективне, концентроване,
легкозасвоюване хелатне мікродобриво
для листового підживлення польових,
овочевих культур та багаторічних насаджень

АЙДАМІН-АМІНО

листкове підживлення, 0,5 л/га



Упаковка
20 л, 1000 л

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для запобігання дефіциту та забезпечення рослин доступними кислотами і амінокислотами, міддю, а також для виведення рослин зі стресових умов різного походження. Регулює рН та зв'язує катіони жорсткості.

ДІЯ ПРЕПАРАТУ

- Підвищує стійкість рослин до стресових абіотичних чинників (спека, посуха, низькі температури) та до гербіцидного стресу.
- Найпотужніша антистресова дія.
- Підвищує водоутримуючу здатність, стійкість до бактеріальних і грибкових захворювань.
- Регулює рН (підкислює воду в баковій суміші), зв'язує катіони жорсткості.

СУМІСНІСТЬ З ІНШИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Сумісний з більшістю добрив та агрохімікатів (ЗЗР). У бакових сумішах регулює рН (підкислює). Дозволяє змішувати різні препарати Айдамін між собою.

ПРИГОТУВАННЯ

Робочий розчин готується в день обробки. Рекомендована норма розведення добрива 1:100. Підживлення проводять по фазах розвитку рослин рано вранці або ввечері, уникаючи яскравого сонця, дощу і сильного вітру, при середньодобовій температурі не нижче +5 °С.



СКЛАД

Вміст елементів живлення, г/л			Вміст солей та похідних кислот, г/л							Густина, г/см ³	рН
N	SO ₄	Cu*	Сукцинати (бурштинової)	Цитрати (лимонної)	Тартрати (винної)	Оксалати (щавлевої)	Малати (яблучної)	Аспарагіinati (аспарагінової)	Глутамати (глутамінової)		
46	3,2	6,2	1	400	1	1	1	1	1	1,05–1,15	0,8–1

* У продукті циклічні сполуки з металом (хелати) утворюють бурштинова, яблучна, аспарагінова, глутамінова, лимонна, щавлева, винна, щавлевобурштинова, щавлевооцтова, етилендіаміндибурштинова, етилендіамінтетраоцтова (EDTA) та ін. кислоти.

НОРМИ ВНЕСЕННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Фаза застосування	Норма, л/га
Зернові	Кущіння — прапорцевий лист	0,5
	При стресі	0,5 ²
Кукурудза, цукровий буряк, соняшник, соя	За потреби ¹	0,5
	При стресі	0,5 ²
Світовий досвід застосування		
Як рН коректор	Для корекції рН та зв'язування катіонів жорсткості	150 мл на 100 л води
Картопля, ріпак, томати, цибуля, часник	За потреби ¹	0,5
	При стресі	0,5 ²
Зерняткові та кісточкові плодів культури, виноград	Перед початком цвітіння	0,5
	Перед початком дозрівання плодів	0,5
	При стресі	0,5 ²

¹ Для запобігання дефіциту та забезпечення рослин доступними кислотами і амінокислотами

² Через 7–10 днів повторити