



Високоєфективне, концентроване,
легкозасвоюване мікродобриво
для листового підживлення польових,
овочевих культур, ягідників і багаторічних рослин

АЙДАМІН-БОР

листокове підживлення, 1–2 л/га



В Упаковка
20 л, 1000 л

ПРИЗНАЧЕННЯ

Забезпечення рослин доступними бором.

Бор — мікроелемент, нестача якого порушує гормональний, водний, азотний і мінеральний обмін в рослинах, запускає процес розпаду білків, відмирання меристемних тканин, накопичення в тканинах аміаку і амідів.

ДІЯ ПРЕПАРАТУ

- Збільшує кількість квіток і плодів.
- Покращує процес запилення квіток.
- Знижує відсоток скидання зав'язі в стресових умовах.
- Перешкоджає виникненню некрозів тканин, деформації листя, хлорозів, гнилей серцевини цукрового буряку.
- Підсилює ростові процеси як кореневої системи, так і вегетативних органів.
- Сприяє стійкості рослин до захворювань.
- Підвищує якісні показники рослин, а саме: вміст цукру в коренеплодах, жирів в олійних культурах, білка в зерні злакових і бобових, аскорбінової кислоти в плодах.
- Сприяє раціональному використанню ґрунтової вологи, регулює водний гомеостаз клітини рослини, підвищує посухостійкість.

СУМІСНІСТЬ З ІНШИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Сумісний з більшістю добрив та агрохімікатів (ЗЗР). У бакових сумішах рекомендується застосовувати з продуктами для корекції рН. У складні бакові суміші додається останнім.



СКЛАД

Вміст елементів живлення, г/л		Коламін*, г/л	Густина, г/см³	рН
В	N			
139–150	69	290	1,25–1,4	7,5

* Коламін — високоактивний біогенний аміноспирт. Підсилює біохімічні процеси в рослинах, підвищує активність життєво важливих ферментів, збільшує поверхню кореневої системи.

НОРМА ВНЕСЕННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Фаза застосування	Норма, л/га
Цукровий буряк	4–6 листків – змикання в рядку і змикання рядків	1–2
Соя	Початок бутонізації – цвітіння	1–2
Соняшник	5–7 листків; 8–10 листків	1–2
Світовий досвід застосування		
Ріпак	Початок бутонізації – цвітіння	1–2

ПРИГОТУВАННЯ

Робочий розчин готується в день обробки. Рекомендована норма розведення мікродобрива 1:100. Підживлення проводять по фазах розвитку рослин, рано вранці або ввечері, уникаючи яскравого сонця, дощу і сильного вітру, при середньодобовій температурі не нижче +5 °С.