



	P ₂ O ₅ *	K ₂ O	N	t кристалізації, °C	Густина, г/см ³	pH
%	26	18	0,001	-18	1,40-1,45	7,5
г/л	377	261	0,01			

* Р (фосфор) в формі іонів ортофосфорної кислоти (єдине сполучення фосфору, яке біологічно поглинається рослинами).

Високоєфективне рідке мінеральне добриво з найнижчим сольовим індексом для листового та кореневого підживлення польових, овочевих культур та багаторічних насаджень

РІДКЕ МІНЕРАЛЬНЕ ДОБРИВО ДАМІН-РК®



Для підживлення рослин на всіх типах ґрунтів та забезпечення рослин комплексним захистом від хвороб та несприятливих факторів навколишнього середовища.

Сприяє збільшенню доступності поживних речовин і покращенню росту кореневої системи рослин на ранніх етапах розвитку, особливо восени та навесні:

- засвоюється відразу після внесення, навіть у холодному ґрунті (середньодобова температура внесення від +5 °C, за винятком екстремальних умов);
- підвищує посухостійкість і має пролонговану дію, якщо внесення проводити до посухи;
- за рахунок К підвищується зимостійкість озимих культур, якщо внесення відбулося за 5-6 днів до перших заморозків;
- висока біодоступність, збільшує цукристість, покращує колір плодів, 0 залишків у продукції та 0 днів очікування перед збиранням врожаю.

НОРМИ ВНЕСЕННЯ ПРЕПАРАТУ

Внесення	Технологія застосування	Норма витрати, л/га
Ґрунтове	Внесення добрив у рядок на культурах: озима пшениця, ячмінь, соя, кукурудза, соняшник, буряк, ріпак	3-5 (5-7 кг/га)
Листкове	Обприскування листя рослин на культурах: озима пшениця, ячмінь, соя, кукурудза, соняшник, буряк, ріпак	0,5-1 у 100-300 л/га робочого розчину
	Сади, виноградники	3-5 у 500-1000 л/га робочого розчину



Р у формі, яка відразу поглинається



Містить будівельний матеріал мембран клітин (кефаліни) та стимулятор росту



Підвищує посухостійкість і має пролонговану дію



Прозора рідина, найнижчий сольовий індекс, не містить шкідливих домішок та гіпсу



Температура кристалізації



Добриво не потребує ґрунтової вологи



Упаковка: **20 л**
Країна виробництва: Україна

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ

Культура	Фаза застосування	Норма, л/га
Кукурудза	5-9 листків, особливо при стресі від зниження температури	0,5-1
Соняшник	4-8 листків, зірочка («монетка»)	
Цукровий буряк	Від 4 листочків до змикання рядків, з обробтками бором	
Соя	2-3 трійчастих листка, початок бутонізації	
Ріпак	4-6 листків, рання стадія розвитку стручків	
Пшениця, ячмінь	Восени від 2-3-х листків, початок виходу в трубку, флаговий лист	
Виноград	3-4 рази за сезон	1-2
Смородина, малина, ожина, полуниця, суниця	Кожні 14 днів	
Яблуня, груша	Набухання бутонів, ріст плодів (1-2 декада липня)	0,5-1
Черешня, вишня, персик, абрикос, слива	Набухання бутонів, ріст плодів (1-2 декада липня) 3-4 рази за сезон	
Томат, перець, баклажан, відкритий ґрунт	Кожні 14 днів, через 2 тижні після висадки розсади	30 мл/10 л робочого розчину
Томат, перець, баклажан, закритий ґрунт	Посів насіння в касети	
	Налив плодів, дозрівання	50 мл/10 л робочого розчину
Картопля	3 першими фунгіцидними обробками (окрім міді), 2-3 рази за сезон	0,5-1
Фертигація	Кожні 14 днів	3-5 у 500-1000 л/га робочого розчину