



Високоєфективне, концентроване,
легкозасвоюване хелатне мікродобриво
для листового підживлення польових
та овочевих культур

АЙДАМІН-МОЛІБДЕН

листокове підживлення, 0,5–1 л/га



Упаковка
20 л, 1000 л

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для запобігання дефіциту та забезпечення рослин доступним молібденом.

Молібден у рослинах стимулює фіксацію атмосферного азоту. Регулює азотний, вуглеводний і фосфорний обмін, синтез хлорофілу і вітамінів. Регулює фотосинтез і дихання. При його нестачі накопичуються токсичні нітрати.

ДІЯ ПРЕПАРАТУ

- Бере участь в синтезі нуклеїнових кислот (РНК і ДНК), вітаміну С і каротину.
- Входить до складу ферменту нітраторедуктази (молібдофлавопротеїну), відновлює нітрати в аміди та аміни, стимулює синтез з них амінокислот і білка.
- Концентрується в бульбах бобових, сприяє їх росту, стимулює фіксацію бульбочкових бактерій атмосферного азоту.

СУМІСНІСТЬ З ІНШИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Сумісний з більшістю добрив та агрохімікатів (ЗЗР). У бакових сумішах з лужними препаратами застосовувати з продуктами для корекції рН. Рекомендується провести тест на сумісність препаратів за декілька днів до обробки.



СКЛАД

Вміст елементів живлення, г/л				Вміст солей та похідних кислот, г/л							Густина, г/см ³	pH
Mo*	Cu*	N	SO ₄	Сукцинати (бурштинові)	Цитрати (лимонні)	Тартрати (винні)	Оксалати (щавлеві)	Малати (яблучні)	Аспарагіinati (аспарагінові)	Глутамати (глутамінові)		
40–119	6,2	46–60	3,2	1	60	1	1	1	0,25	0,25	1,05–1,4	1,5–2,5
Бета-Індолілоцтова кислота, г/л — 0,0215							Бета-Індолілмасляна кислота, г/л — 0,0215					

* У продукті циклічні сполуки з металом (хелати) утворюють бурштинова, яблучна, аспарагінова, глутамінова, лимонна, щавлева, винна, щавлевобурштинова, щавлевооцтова, етилендіаміндибурштинова, етилендіамінтетраоцтова (EDTA) та ін. кислоти.

НОРМИ ВНЕСЕННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Фаза застосування	Норма, л/га
Соя	1–2-й трійчастий листок	0,5–1
Цукровий буряк, кукурудза, соняшник, озима пшениця	За потреби — для запобігання дефіциту та забезпечення рослин доступним молібденом	0,5–1
Світовий досвід застосування		
Горох	Початок бутонізації	0,5–1
Ріпак, цибуля, часник, картопля	За потреби — для запобігання дефіциту та забезпечення рослин доступним молібденом	0,5–1

ПРИГОТУВАННЯ

Робочий розчин готується в день обробки. Рекомендована норма розведення добрива 1:100. Підживлення проводять по фазах розвитку рослин рано вранці або ввечері, уникаючи яскравого сонця, дощу і сильного вітру, при середньодобовій температурі не нижче +5 °С.