



ОПИС ПРОДУКТІВ АЙДАМІН® ЗА КУЛЬТУРАМИ

ГОРОХ

Листова обробка. Фаза сходи:

АЙДАМІН-КОМПЛЕКСНИЙ

лишкове підживлення, 0,5–1 л/га

Додатково можливо застосування

АЙДАМІН-ЦИНК

лишкове підживлення, 1 л/га

та АЙДАМІН-ЗАЛІЗО

лишкове підживлення, 1–2 л/га

- Швидко всмоктується і усуває дефіцит заліза.
- Сумісне в одній баковій суміші з КЛ та Айдамін-Цинк.

Фаза бутонізація та налив:

АЙДАМІН-БОР

лишкове підживлення, 1–2 л/га

- Бор в біологічно активній формі прискореного засвоєння: чотирьохкоординовані внутрішньокмплесні з'єднання —

моноетаноламін (N→B) тригидроксидоборат і діетаноламін (N→B) тригидроксидоборат.

- Швидко всмоктується і усуває дефіцит бору.
- Високий рівень запилення.
- Сприяє раціональному використанню ґрунтової вологи; регулює водний гомеостаз клітин.
- Прискорює міграцію поживних речовин з листя до органів плодоношення і коріння.

та АЙДАМІН-АМІНО

лишкове підживлення, 0,2–0,5 л/га

- Підвищує стійкість рослин до стресових абіотичних чинників (спека, посуха, низькі температури) та до гербіцидного стресу.
- Найпотужніша антистресова дія.
- Підвищує водоутримуючу здатність, стійкість до бактеріальних і грибкових захворювань.

СХЕМА ЗАСТОСУВАННЯ

