



ОПИС ПРОДУКТІВ АЙДАМІН® ЗА КУЛЬТУРАМИ

КАПУСТА

Листова обробка. Фаза висадки розсади:

АЙДАМІН-БОР

листокове підживлення, 0,5 л/га

разом з АЙДАМІН-АМІНО

листокове підживлення, 0,2–0,5 л/га

- Підвищує стійкість рослин до стресових абіотичних чинників (спека, посуха, низькі температури) та до гербіцидного стресу.
- Найпотужніша антистресова дія.
- Підвищує водоутримуючу здатність, стійкість до бактеріальних і грибкових захворювань.

Фази 3 справжніх листа та зростання кочана:

АЙДАМІН-КОМПЛЕКСНИЙ

листокове підживлення, 0,5–1 л/га

Додатково можливо застосування:

АЙДАМІН-ЦИНК

листокове підживлення, 1 л/га

та АЙДАМІН-ЗАЛІЗО

листокове підживлення, 1–2 л/га

- Швидко всмоктується і усуває дефіцит заліза.
- Сумісне в одній баковій суміші з КЛ та Айдамін-Цинк.

Фаза початок формування кочана:

АЙДАМІН-БОР

листокове підживлення, 1–2 л/га

- Бор в біологічно активній формі прискороного засвоєння: чотирьохкоординовані внутрішньокмплескні з'єднання — моноетаноламін (N→B) тригидроксидборат і діетаноламін (N→B) тригидроксидборат.
- Швидко всмоктується і усуває дефіцит бору.
- Високий рівень запилення.
- Сприяє раціональному використанню ґрунтової вологи; регулює водний гомеостаз клітин.
- Прискорює міграцію поживних речовин з листя до органів плодоношення і коріння.

та АЙДАМІН-АМІНО

листокове підживлення, 0,2–0,5 л/га

та РІДКИЙ АКТИВАТОР АЙДАМІН-ЦИТО

листокове підживлення, 0,5 л/га

- Формування врожаю з високими якісними характеристиками завдяки активному клітинному розподілу в плодах.

СХЕМА ЗАСТОСУВАННЯ У ВІДКРИТОМУ ҐРУНТІ

