



ОПИС ПРОДУКТІВ АЙДАМІН® ЗА КУЛЬТУРАМИ

КАРТОПЛЯ

Листова обробка. Фаза подовження стебла:

АЙДАМІН-КОМПЛЕКСНИЙ

листкове підживлення 0,5–1 л/га

Додатково можливо застосування:

АЙДАМІН-ЦИНК

листкове підживлення, 1–2 л/га

- Потреба в цинку Zn для врожаю 60 т/га — 200 г/га (NU-Agrar GmbH 02/12/2011).
- Швидко всмоктується і усуває дефіцит цинку.
- Не засмічує форсунки обприскувача.

та **АЙДАМІН-ЗАЛІЗО**

листкове підживлення, 1–2 л/га

- Потреба в залізі Fe для врожаю 60 т/га — 500 г/га (NU-Agrar GmbH 02/12/2011).
- Швидко всмоктується і усуває дефіцит заліза.
- Сумісне в одній баковій суміші з КЛ та Айдамін-Цинк.

Фаза початок цвітіння:

АЙДАМІН-БОР

листкове підживлення, 1–2 л/га

- Бор в біологічно активній формі прискороного засвоєння: чотирьохкоординовані внутрішньокмплесні з'єднання — моноетаноламін (N→B) тригидроксидоборат і діетаноламін (N→B) тригидроксидоборат.
- Потреба в борі B для врожаю 60 т/га — 150 г/га (NU-Agrar GmbH 02/12/2011).

СХЕМА ЗАСТОСУВАННЯ MIN

Картоплі для врожаю 60 т/га потрібно 200 г/га цинку та 150 г/га бору




СХЕМА ЗАСТОСУВАННЯ MID

Картоплі для врожаю 60 т/га потрібно 500 г/га заліза та 150 г/га бору




СХЕМА ЗАСТОСУВАННЯ MAX

Картоплі для врожаю 60 т/га потрібно 500 г/га заліза та 150 г/га бору

