



ОПИС ПРОДУКТІВ АЙДАМІН® ЗА КУЛЬТУРАМИ

ПОЛУНИЦЯ

Листова обробка. Фаза поява квітконосу і повторно в першій декаді серпня фаза диференціація бруньок
АЙДАМІН-КОМПЛЕКСНИЙ
лишкове підживлення, 0,5–1 л/га

Додатково можливо застосування
АЙДАМІН-ЦИНК
лишкове підживлення, 1 л/га
та АЙДАМІН-ЗАЛІЗО
лишкове підживлення, 1–2 л/га

- Швидко всмоктується і усуває дефіцит заліза.
- Сумісне в одній баковій суміші з КЛ та Айдамін-Цинк.

Фаза повний вихід квітконосу — початок цвітіння (повторити після збору врожаю):
АЙДАМІН-БОР
лишкове підживлення, 1–2 л/га

- Бор в біологічно активній формі прискореного засвоєння: чотирьохкоординовані внутрішньокмплесні з'єднання — моноетаноламін (N→B) тригидроксидоборат і діетаноламін (N→B) тригидроксидоборат.

- Швидко всмоктується і усуває дефіцит бору.
- Високий рівень запилення.
- Сприяє раціональному використанню ґрунтової вологи; регулює водний гомеостаз клітин.
- Прискорює міграцію поживних речовин з листя до органів плодоношення і коріння.

та АЙДАМІН-АМІНО
лишкове підживлення, 0,2–0,5 л/га

- Підвищує стійкість рослин до стресових абіотичних чинників (спека, посуха, низькі температури) та до гербіцидного стресу.
- Найпотужніша антистресова дія.
- Підвищує водоутримуючу здатність, стійкість до бактеріальних і грибкових захворювань.

та РІДКИЙ АКТИВАТОР АЙДАМІН-ЦИТО
лишкове підживлення, 0,5 л/га

Фаза формування ягід:
РІДКИЙ АКТИВАТОР АЙДАМІН-ЦИТО
лишкове підживлення 0,5 л/га

- Активізує процеси клітинного ділення та транспортування цукрів до репродуктивних органів.
- Підвищує стійкість рослин до високих температур в умовах теплового стресу.
- Сприяє активному цвітінню та заплідненню.
- Впливає на розподіл ауксину та регулює його дію.
- Сприяє формуванню більшій кількості пагонів і бічних відгалужень, повноцінному наливу плодів.
- Зростає вміст загального цукру.

СХЕМА ЗАСТОСУВАННЯ

