



ОПИС ПРОДУКТІВ АЙДАМІН® ЗА КУЛЬТУРАМИ

КВАСОЛЯ

Обробка насіння:

АЙДАМІН-КОМПЛЕКСНИЙ
обробка насіння, 2 л/т

- Гарантовано кращі сходи (результати досліджень, звіти наукових установ, досвід застосування в господарствах). Протруйники насіння: Імідаклоприд 360 грам/т, Металаксил-М 10 грам/т, Флудиоксонил 25 грам/т, Інокулянт – згідно інструкції.

АЙДАМІН-NPK 8/24, 30 кг/га

- При сівбі у рядок, безпосередньо на насінину.
- Швидкий старт. Сприяє збільшенню доступності поживних речовин і покращенню росту кореневої системи на ранніх етапах розвитку.
- Засвоюється відразу після внесення, навіть у холодному ґрунті.

Листова обробка.

Фаза 3-й трійчастий листок:

АЙДАМІН-КОМПЛЕКСНИЙ
лишкове підживлення, 1 л/га

- Мікроелементи, які дуже важливі для квасолі: бор В, залізо Fe, марганець Mn, цинк Zn, молібден Мо (NU-Agrar GmbH 02/12/2011 80).

АЙДАМІН-МОЛІБДЕН

лишкове підживлення, 0,5-1 л/га

- Бере участь в синтезі нуклеїнових кислот РНК і ДНК, вітаміну С і каротину.
- Входить до складу ферменту нітраторедуктази (молібдофлавопротеїну), відновлює нітрати в аміди та аміни, стимулює синтез з них амінокислот і білка.
- Концентрується в бульбах бобових, сприяє їх росту, стимулює фіксацію бульбочкових бактерій атмосферного азоту.

Фаза початок бутонізації. Готуємо бакову

суміш, до якої першим додаємо

АЙДАМІН-АМІНО-БУФЕР
0,2-0,5 л/га

- Підвищує стійкість рослин до стресових абіотичних чинників (спека, посуха, низькі температури) та до гербіцидного стресу.
- Найпотужніша антистресова дія.
- Підвищує водоутримуючу здатність, стійкість до бактеріальних і грибкових захворювань.
- Регулює рН (підкислює воду в баковій суміші) розчину до значення 3,5-6.
- Зв'язує катіони жорсткості.

Другим додаємо

РІДКИЙ АКТИВАТОР АЙДАМІН-ЦИТО
лишкове підживлення, 0,5-1 л/га

- Активізує процеси клітинного ділення та транспортування цукрів до репродуктивних органів.
- Підвищує стійкість рослин до високих температур в умовах теплового стресу.
- Сприяє активному цвітінню та заплідненню.
- Впливає на розподіл ауксину та регулює його дію.
- Сприяє формуванню більшій кількості пагонів і бічних відгалужень, повноцінному наливу плодів.

Останнім додаємо

АЙДАМІН-БОР-МОЛІБДЕН
лишкове підживлення, 1-2 л/га

- Збільшує кількість квіток і плодів, покращує процес запилення, знижує відсоток скидання зав'язі у стресових умовах.
- Запобігає виникненню некрозів тканин, деформацій листя, хлорозів, гнилі серцевини цукрового буряку. Забезпечує стійкість рослин до хвороб.
- Посилює ростові процеси як кореневої системи, так і вегетативних органів.
- Бере участь в синтезі нуклеїнових кислот і вітаміну С.
- Сприяє раціональному використанню ґрунтової вологи, регулює водний гомеостаз клітин, підвищує посухостійкість рослин.

Фаза формування бобів:

АЙДАМІН-БОР-МОЛІБДЕН
лишкове підживлення, 1 л/га



СХЕМА ЗАСТОСУВАННЯ MIN




СХЕМА ЗАСТОСУВАННЯ MAX

Результат застосування:

+1500 кг до контролю

ТОВ «Кишенці», Черкаська обл.

Урожайність: **35 ц/га**

