



ОПИС ПРОДУКТІВ АЙДАМІН® ЗА КУЛЬТУРАМИ

МОРКВА

Листова обробка. Фаза сході:

АЙДАМІН-БОР

лишкове підживлення, 0,5 л/га

разом з АЙДАМІН-АМІНО листкове
підживлення, 0,2–0,5 л/га

- Підвищує стійкість рослин до стресових абіотичних чинників (спека, посуха, низькі температури) та до гербіцидного стресу.
- Найпотужніша антистресова дія.
- Підвищує водоутримуючу здатність, стійкість до бактеріальних і грибкових захворювань.

Фаза 3 справжніх листа:

АЙДАМІН-КОМПЛЕКСНИЙ

лишкове підживлення, 0,5–1 л/га

Додатково можливо застосування:

АЙДАМІН-ЦИНК

лишкове підживлення, 1 л/га

та АЙДАМІН-ЗАЛІЗО

лишкове підживлення, 1–2 л/га

- Швидко всмоктується і усуває дефіцит заліза.
- Сумісне в одній баковій суміші з КЛ та Айдамін-Цинк.

Фаза розвиток вегетативних частин:

АЙДАМІН-БОР

лишкове підживлення, 1–2 л/га

- Бор в біологічно активній формі прискореного засвоєння: чотирьохкоординовані внутрішньокмплексні з'єднання — моноетаноламін (N→B) тригидроксидоборат і діетаноламін (N→B) тригидроксидоборат.
- Швидко всмоктується і усуває дефіцит бору.
- Сприяє раціональному використанню ґрунтової вологи; регулює водний гомеостаз клітин.
- Прискорює міграцію поживних речовин з листя до коріння.

та АЙДАМІН-АМІНО

лишкове підживлення, 0,2–0,5 л/га

Також можливо застосувати:

РІДКИЙ АКТИВАТОР АЙДАМІН-ЦИТО

лишкове підживлення, 0,5 л/га

- Активізує процеси клітинного ділення та транспортування цукрів до репродуктивних органів.
- Підвищує стійкість рослин до високих температур в умовах теплового стресу.
- Впливає на розподіл ауксину та регулює його дію.
- Зростає вміст загального цукру.

СХЕМА ЗАСТОСУВАННЯ У ВІДКРИТОМУ ҐРУНТІ

Результат застосування:
зростає вміст загального
цукру на **2–3,5%**.

Інститут овочівництва
і баштанництва,
Харківська обл.

