



ОПИС ПРОДУКТІВ АЙДАМІН® ЗА КУЛЬТУРАМИ

ОГІРОК

Листова обробка.

Фаза 2–4 пари справжніх листків:

АЙДАМІН-КОМПЛЕКСНИЙ

листякове підживлення, 0,5–1 л/га

Фаза початок цвітіння:

АЙДАМІН-БОР

листякове підживлення, 1–2 л/га

- Бор в біологічно активній формі прискореного засвоєння: чотирьохкоординовані внутрішньокмплексні з'єднання — моноетаноламін (N→B) тригидроксидборат і діетаноламін (N→B) тригидроксидборат.
- Швидко всмоктується і усуває дефіцит бору.
- Високий рівень запилення.
- Сприяє раціональному використанню ґрунтової вологи; регулює водний гомеостаз клітин.
- Прискорює міграцію поживних речовин з листя до органів плодоношення і коріння.

та **АЙДАМІН-АМІНО**

листякове підживлення, 0,2–0,5 л/га

- Підвищує водоутримуючу здатність, стійкість до бактеріальних і грибкових захворювань.

- Підвищує стійкість рослин до стресових абіотичних чинників (спека, посуха, низькі температури) та до гербіцидного стресу.
- Найпотужніша антистресова дія.

та **РІДКИЙ АКТИВАТОР АЙДАМІН-ЦИТО**

листякове підживлення, 0,5 л/га

Фаза ріст плодів:

РІДКИЙ АКТИВАТОР АЙДАМІН-ЦИТО

листякове підживлення, 0,5 л/га

- Активізує процеси клітинного ділення та транспортування цукрів до репродуктивних органів.
- Підвищує стійкість рослин до високих температур в умовах теплого стресу.
- Сприяє активному цвітінню та заплідненню.
- Відмічається істотне зростання у плодах огірка загального цукру (2,65 %), аскорбінової кислоти (13,60 мг/100 г), також зменшується вміст нітратів відносно фонового використання мінеральних добрив (137 мг/кг сирої маси).

СХЕМА ЗАСТОСУВАННЯ У ВІДКРИТОМУ ҐРУНТІ

Результат застосування:

+ 6,5 т/га (22,7%)

до контролю

Інститут овочівництва
і баштанництва,
Харківська обл.

Урожайність: **35,1 т/га**

Товарність: **89,1%**

