




Високоєфективне, концентроване,
легкозасвоюване хелатне мікродобриво
для листового підживлення польових,
овочевих культур та багаторічних насаджень

АЙДАМІН-МІДЬ

листокове підживлення, 1–2 л/га



Упаковка
20 л, 1000 л

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для запобігання дефіциту та забезпечення рослин доступною міддю. Мідь у рослинах регулює дихання, фотосинтез, вуглеводний, білковий, водний обмін і концентрацію ростових речовин.

ДІЯ ПРЕПАРАТУ

- Бере участь у побудові та стабілізації хлорофілу.
- Підвищує стійкість рослин до стресових абіотичних чинників (спека, посуха, низькі температури, засоленість ґрунтів).
- Підвищує вологоутримуючу здатність, стійкість до бактеріальних і грибкових захворювань.
- Активізує репродукцію.
- Активатор ензимів.

СУМІСНІСТЬ З ІНШИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Сумісний з більшістю добрив та агрохімікатів (ЗЗР). З лужними препаратами застосовувати з продуктами для корекції pH. Рекомендується провести тест на сумісність препаратів за декілька днів до обробки.

ПРИГОТУВАННЯ

Робочий розчин готується в день обробки. Рекомендована норма розведення добрива 1:100. Підживлення проводять по фазах розвитку рослин рано вранці або ввечері, уникаючи яскравого сонця, дощу і сильного вітру, при середньодобовій температурі не нижче +5 °C.



СКЛАД

Вміст елементів живлення, г/л			Вміст солей та похідних кислот, г/л							Густина, г/см ³	pH
Cu*	N	SO ₄	Сукцинати (бурштинової)	Цитрати (лимонної)	Тартрати (винної)	Оксалати (щавлевої)	Малати (яблучної)	Аспарагіinati (аспарагінової)	Глутамати (глутамінової)		
60–80	22–46	40–50	1	25	1	1	1	0,25	0,25	1,2–1,4	2
Бета-Індолілоцтова кислота, г/л — 0,0215							Бета-Індолілмасляна кислота, г/л — 0,0215				

* У продукті циклічні сполуки з металом (хелати) утворюють бурштинова, яблучна, аспарагінова, глутамінова, лимонна, щавлева, винна, щавлевобурштинова, щавлевооцтова, етилендіаміндибурштинова, етилендіамінтетраоцтова (EDTA) та ін. кислоти.

НОРМИ ВНЕСЕННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Фаза застосування	Норма, л/га
Зернові	Кушіння — прапорцевий лист	1–2
Кукурудза, цукровий буряк, соняшник, соя	За потреби ¹	1–2
Світовий досвід застосування		
Картопля	Стеблуння — початок в'янення і відмирання бадилля	1–2
Ріпак	За потреби ¹	1
Томати	Повне цвітіння — досягання плодів	1–2
Цибуля і часник	Початок формування — кінець наливу цибулин	1–2
Зерняткові та кісточкові плодів культури	Перед початком цвітіння	1–2
	Перед початком дозрівання плодів	1–2
Виноград	Перед початком цвітіння	1–2
	Перед початком дозрівання плодів	1–2

¹ Для запобігання дефіциту та забезпечення рослин доступними кислотами, амінокислотами і міддю.