



ОПИС ПРОДУКТІВ АЙДАМІН® ЗА КУЛЬТУРАМИ

ТОМАТ

Листова обробка. Фаза 3–4 справжніх листочка:
АЙДАМІН-КОМПЛЕКСНИЙ
листкове підживлення 0,5–1 л/га


Додатково можливо застосування:
АЙДАМІН-ЦИНК
листкове підживлення, 1 л/га
та **АЙДАМІН-ЗАЛІЗО**
листкове підживлення, 1–2 л/га

- Швидко всмоктується і усуває дефіцит заліза.
- Сумісне в одній баковій суміші з КЛ та Айдамін-Цинк.

Фаза початок цвітіння:
АЙДАМІН-БОР
листкове підживлення, 1–2 л/га

- Бор в біологічно активній формі прискороного засвоєння: чотирьохкоординовані внутрішньокомплексні з'єднання — моноетаноламін (N→B) тригидроксидоборат і діетаноламін (N→B) тригидроксидоборат.
- Швидко всмоктується і усуває дефіцит бору.
- Високий рівень запилення.
- Сприяє раціональному використанню ґрунтової вологи; регулює водний гомеостаз клітин.
- Прискорює міграцію поживних речовин з листя до органів плодоношення і коріння.

СХЕМА ЗАСТОСУВАННЯ MIN



та **АЙДАМІН-АМІНО**
листкове підживлення, 0,2–0,5 л/га

- Підвищує стійкість рослин до стресових абіотичних чинників (спека, посуха, низькі температури) та до гербіцидного стресу.
- Найпотужніша антистресова дія.
- Підвищує водоутримуючу здатність, стійкість до бактеріальних і грибкових захворювань.

та **РІДКИЙ АКТИВАТОР АЙДАМІН-ЦИТО**
листкове підживлення 0,5 л/га

Фаза формування плодів:
РІДКИЙ АКТИВАТОР АЙДАМІН-ЦИТО
листкове підживлення, 0,5 л/га

- Активізує процеси клітинного ділення та транспортування цукрів до репродуктивних органів.
- Підвищує стійкість рослин до високих температур в умовах теплового стресу.
- Сприяє активному цвітінню та заплідненню.
- Впливає на розподіл ауксину та регулює його дію.
- Сприяє формуванню більшій кількості пагонів і бічних відгалужень, повноцінному наливу плодів.
- Зростає вміст загального цукру (до рівня 3,85 %).



СХЕМА ЗАСТОСУВАННЯ MID




СХЕМА ЗАСТОСУВАННЯ MAX

Результат застосування:
+10,9 т/га (26,8%)
до контролю

Інститут овочівництва
і баштаниництва,
Харківська обл.
Урожайність: **51,6 т/га**
Товарність: **87,6%**

